

BULETIN DE AVERTIZARE


Nr. 22 din 24 mai 2022

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: *Cydia f.* - **VIERMELE PRUNELOR** (generația I), *Monilinia l.* – **MONILIOZĂ**, *Polystigma r.* - **PĂTAREA ROȘIE A FRUNZELOR** și *Stigmata c.* - **CIURUIREA FRUNZELOR**, se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de PRUN, cu produse de protecție a plantelor omologate:


1. LASER 240 SC 0,6 l/ha + TELDOR 500 SC 0,8 l/ha sau
 2. CORAGEN 100 ml/ha + FOLPAN 80 WDG (FLOVINE) 0,2% sau
 3. AFFIRM OPTI 2,5 kg/ha + ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW) 0,075 - 0,1% (0,75 - 1,0 l/ha) sau
 4. POLECI (DECA 2,5 EC) 30 - 50 ml/hl (0,03 - 0,05%) + ALCUPRAL 50 PU 0,15 - 0,2% (1,5- 2,0 kg/ha) sau
- (doze diferențiate conform tabelului)

alte produse pentru protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Nr. crt.	Produsul de protecție a plantelor	Organisme dăunătoare combătute
1.	LASER 240 SC, CORAGEN, POLECI (DECA 2,5 EC), AFFIRM OPTI	viermele prunelor
2.	TELDOR 500 SC, ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW)	monilioză
3.	FOLPAN 80 WDG (FLOVINE)	pătarea roșie și ciuruirea frunzelor
4.	ALCUPRAL 50 PU	pătarea roșie a frunzelor, monilioză (0,2%) ciuruirea frunzelor (0,15 - 0,2%)




Viermele prunelor



Monilioză



Pătarea roșie




Ciuruirea frunzelor

Perioada optimă de tratament: 25 - 28 mai 2022

- Tratamentul se va repeta la 8 - 10 zile cu o altă variantă de produse.
- În cazul în care timpul este nefavorabil (ploaie, vânt), tratamentul se va prelungi cu numărul zilelor nefavorabile.

- Viermele prunelor se poate combate și prin metoda captării în masă a masculilor, cu ajutorul capcanelor cu feromoni "atraFUN".



Capcană cu feromoni

Alte recomandări:

Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor (p.p.p.) se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Acestea se vor depozita în magazine până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide sau se pot preda și în campaniile “SCAPA de ambalaje” – www.aiprom.ro.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sibiu
Dr. Biol. Livia Dana ALDEA



Responsabil Prognoză și Avertizare
Cons. sup. Ana TIMAR