



Sibiu
Nr. 398 /O/17.05.2019

INFORMARE

Respectarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, Legea 383/2013 și Ordinul 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR

Activitatea în apicultură poate fi practică de orice persoană fizică sau juridică cu respectarea legislației în vigoare.

➤ **Deținătorii culturii agricole cât și deținătorii de stupi, conform legislației în vigoare (L. nr. 383/2013 cu modificările ulterioare) au următoarele îndatoriri comune:**

ART. 10

(1) Polenizarea dirijată a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizează pe bază de contracte încheiate între proprietarii familiilor de albine și deținătorii de culturi.

ART. 13

(1) Amplasarea familiilor de albine pe terenurile deținute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanță de cel puțin 10 m față de drumurile publice sau hotarele proprietăților din domeniul public aflate în intravilan ori în extravilan și la o distanță de cel puțin 5 m față de hotarele proprietăților din domeniul privat aflate în intravilan ori în extravilan.

ART. 15

(1) Pentru prevenirea intoxicațiilor la albine, deținătorii de suprafețe agricole și silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole și silvice pe care le dețin sunt obligați să anunțe, în scris, consiliile locale cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, precum și denumirea produsului folosit.

(2) Consiliile locale, precum și administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunțe, în scris sau telefonic, apicultorii care au vatră de stupină staționară/permanentă sau temporară/pastorală, cu cel puțin 24 de ore înaintea efectuării de către deținătorii de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor cu substanțe chimice, în vederea prevenirii intoxicațiilor la albine.

(3) În cazul în care apicultorul, prin nerespectarea de către deținătorul de suprafețe agricole și silvice a prevederilor alin. (1), înregistrează mortalități la familiile de albine, consiliul local și administratorii terenurilor agricole sau silvice, în baza documentului sanitar-veterinar de constatare a cauzelor mortalității, întocmesc un proces-verbal de evaluare a pagubelor și stabilesc cuantumul despăgubirilor care se acordă apicultorului de către deținătorii de suprafețe agricole sau silvice, la valoarea de piață a familiilor de albine și a producției de miere care ar fi trebuit obținută în urma culesului.

ART. 17

Având în vedere importanța deosebită pe care o are baza meliferă națională pentru apicultură și producțiile realizate, organizarea activității de stupărit pastoral reprezintă o prioritate pentru consiliile locale, precum și pentru administratorii terenurilor agricole sau silvice.

ART. 18

(I) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

g) cu amendă de la 50 lei la 100 lei, în cazul neanunțării de către apicultor, în maximum 24 de ore

de la instalarea stupinei pe vatră, a consiliului local și a administratorilor terenurilor agricole sau silvice pe raza căruia se deplasează cu stupii în pastoral;

i) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nerespectării de către apicultor a distanțelor dintre stupine la culturile agricole;

k) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 15 alin. (1) și (2), precum și acordarea de despăgubiri apicultorului pentru daunele create;

l) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 13 alin. (1) și (2).

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele abilitate.

➤ **Ordinul 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Asociația crescătorilor de Albine – privind unele măsuri pentru protecția intoxicațiilor cu pesticide**

- tratamentele cu pesticide asupra culturilor agricole, plantațiilor pomicole și a pădurilor se vor desfășura în perioadele de timp cât mai scurte care nu vor depăși 7 zile consecutive pentru o cultură agricolă sau un trup de pădure, vor fi anunțate apicultorilor astfel încât aceștia să poată proteja familiile de albine prin închiderea sau îndepărtarea stupilor în intervale de timp cât timp mai redus cu puțină (*Tabel nr.1*);

- tratamentele fitosanitare cu pesticide la culturile agricole, plantații pomicole și silvice se vor face numai pe baza avertizărilor scrise, emise de oficiul fitosanitar și unitățile silvice;

- să administreze produse de protecție a plantelor numai pe timp liniștit, fără vânt și numai asupra culturilor agricole entomofile sau pomilor fructiferi care nu se află în stadiul de înflorire;

- este interzisă aplicarea pesticidelor cu excepția celor atestate prin mențiunea că nu sunt toxice pentru albine, asupra culturilor entomofile, pomilor fructiferi, sau principalelor specii forestiere melifere (salcâm, tei) aflate în faza de înflorire, precum și a arborilor forestieri de aliniament aflați în perioade critice (*Tabel nr.2*);

UNITĂȚILE AGRICOLE, SILVICE PRECUM ȘI CELELALTE UNITĂȚI care execută sau beneficiază de tratamente fitosanitare cu pesticide sunt obligate:

- să înștiințeze în scris sau prin nota telefonică cu cel puțin 7 zile înainte de începerea tratamentului consiliile locale, comunale, orașenești sau municipale și primarii, pe teritoriul cărora se găsesc suprafețele ce urmează a fi tratate precum și cele ale căror limite teritoriale se află la mai puțin de 5 km de aceste suprafețe conținând următoarele date: locul tratamentului, data începerii și durata tratamentului, denumirea produsului folosit și remanența acestuia, metoda de aplicare și mijlocul cu care se execută;

PERSOANE FIZICE

- persoanele fizice utilizează numai produse omologate, clasificate Xn și Xi numai pentru scopuri personale;

- să cosească sau să smulgă buruienile înflorite din grădină sau livada supusă tratamentului înainte de începerea acestuia;

- să anunțe primăria de aplicarea tratamentului, cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acestuia în vederea avertizării tuturor apicultorilor care au stupinele situate pe o rază de 3 km de locul unde se efectuează tratamentul.

CONSILIILE LOCALE, COMUNALE, ORĂȘENEȘTI SAU MUNICIPALE ȘI PRIMĂRII

- vor lua măsuri pentru anunțarea în scris, cu cel puțin 5 zile înainte, sub semnătură de luare la cunoștință, a tuturor deținătorilor de stupine situate în raza teritorială a localității, precum și circumscripția sanitară veterinară, despre locul, data începerii și mijloacele cu care se execută tratamentele cu pesticide.

Tabel cu intervalele de timp necesare pentru îndepărtarea sau închiderea stupilor în funcție de natura produsului de protecție a plantelor folosit

NR. CRT	GRUPA	PERI-OADA (ORE) ÎNDEPĂRTARE ALBINE	SUBSTANȚA ACTIVĂ	Denumire comercială a produsului de protecție a plantelor
1.	ERBICIDE	24 ore	Diquat*	Barclay D-quat**, Reglone Forte**, Dessicash 200 SL (Diqua 200 SL)**, Mission**, Quad-Glob 200 SL
		48 ore	Acid 2,4 D	Amino 600 SL, Dicopur D (Prodate Redox), Dicopur Top 464 SL (Ceredin Forte 464 SL), DMA Extra 600 SL, Esteron Extra 600 EC, Estet (Amino Gold), Gentis 450 EC, Hussar Activ OD, Kyleo, SDMA Super, Mustang Forte 195 SE, Buctril Universal, Concordia 306 SE, Mustang /(Vector), Premiant (Tellurium), Turbo Flo
2.	FUNGICIDE	24 ore	Captan	Captan 80 WDG (Caiman), Flint Plus 64 WG, Lekaro, Merpan 50 WP, Merpan 80WG (Captadin 80 WDG), Scab 80 WG (Caption 80WG), Scab 480 SC
			Mancozeb	Acrobat MZ 69 WG, Cymco 72 WP, Cymco Super/(Profilux), Dithane M 45, Dithane Neotec 75 WG, Efmanceb80 WP, Electis 75 WG, Fortuna (Fudan), Fortuna Globe (Fudan 75), Manfil 75 WG, Manfil 80 WP (Mancosol 80 WP), Manzate 75 DF, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP (Combi Duo), Nautile WG (Video), Novozir MN 80, Valbon, Valis M (Emendo M), Vondozeb (Manzate), Winner M 80, Alfil Duplo, Armetil M (Manoxim Mix), Biskaine WG, Curzate Manox, Drago 76 WP, Fanion WG, Fantic M, Galben M, Katanga Man, Pergato MZ (Gett), Planet 72 WP, Ridomil Gold MZ 68 WG (Fubol Gold)
			Sulf	Cosavet 80 DF, Flosul, Heliosulf, Kumulus DF, Microthiol Special, Polisulf TIP „M.I.F”, Pol-Sulphur 80 WG, Pol-Sulphur 80 WP, Pol-Sulphur 800 SC, Sulfavit 80 PU, Sulfavit 95 PP, Sulfolac 80 WG, Sulfomat 80 PU, Sulfomat 93 P, Sulphur 80 WG, Thiovit Jet 80 WG, Mystic Combi
			Ziram	Korit 420 FS**
			- Oxiclora de cupru - Cupru, sulfat de cupru - Hidroxid de cupru	Airone SC, Alcupral 50 PU, Badge WG, Bouillie Bordelaise WDG, Champ 77 WG (Coopermax), Cupertine Super, Cupforce Extra, Cuprofix Ultra, Cuproxat Flowable (Kupferol), Curenox 50, Cyclo-R Liquido, Flowbrix, Funguran OH 300 SC, Funguran OH 50 WP, Kocide 2000, Kupfer Fusilan WG, Triumpf 40 WG, Vitra 50 WP (Cupridin), Zeama Bordeleza TIP „MIF” (Zeama Bordeleza Valles), Armetil Cobre (Manoxim Combi), Melody Compact 49 WG, Molovin, Pergado C, Ridomil Gold Plus 42,5 WP, Maniflow
Tiofanat metil	Bisild Top 370 FS, Biosild Top, Duett Ultra**, Top Plus, Topsin 500 SC, Topsin 70 WDG, Topsin M 500 SC, Yamato			
3.	INSECTICIDE - Carbamice	72 ore	Oxamil	Afromyl, Vydate 10 G *, Vydate 10 L *
	INSECTICIDE Organo-fosforice	72 ore	Dimetoat	Novadim Progress (Sinoratox 400 EC)
			Fosmet	Imidan 40 WG, Imidan 50 WP
INSECTICIDE Piretroizi	48 ore	-Deltametrin, -Cipermetrin, - -Lambda-cihalotrin, - Alfa cipermetrin, - - Zeta cipermetrin, - - Tau fluvalerate, - Esfenvalerat, - Gama cihalotrin	Decis 25 WG, Decis Expert 100 EC, DelCaps 050 CS (Deltop 050 CS), Deltagri (Faster Delta), Gat Decline 2,5 EC, Granprotec, Grial, K Obiol 25 EC, Poleci (Deca 2,5 EC), Scatto, Proteus OD 110, Pynrex Quick, Bellem 0,8 MG (Picador 0,8 MG), Cyperquard 25 EC (Catapult), Efcymethrin 10 EC, Faster 10 CE, Fury Geo, Nurelle D 50/500 EC, Sherpa 100 EW (Cyperfor 100 EW), Signal 300 ES (Langis), Daskor 440 (Nurelle M), Corocid Super, Cyclone, Ercole, Kaiso Sorbie 5 EG (Lamdex Neo), Karate Zeon (Ninja), Karis 10 CS (Laidir 10 CS), Lamdex Extra, Patrol 2,5 WG, Trika Expert, Zebra, Ampligo, Inazuma, Alfametrin 10 EC (Afladone 10 EC), Bestseller 100 EC (Zebra Activ), Fastac 10 EC, Fastac Active, Fasthrin 15 WG, Fury 10 EC (Minuet), Mavrik 2 F (Evure), Plinto 2,5 EC (Alfasure 2,5 EC), Sumi Alpha 5 EC (Wizard), Cylotrin 60 CS, Vantex 60 CS (Nexide 60 CS),	

NOTĂ: * Produse de protecție a plantelor din grupa de toxicitate T+

** Produse de protecție a plantelor din grupa de toxicitate T

- Pentru mai multe informații în ceea ce privește protecția familiilor de albine vizitati site-ul http://www.icdapicultura.ro/extensie/publicatii/ghid_de_bune_practici_fermieriapicultorieeditia_1.html– Ghid de bune practici pentru fermieri și apicultori, Ediția I – 2018 și - Cod de bune practici în relația dintre fermieri și apicultori.
- Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor respecta:
- Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România;
- Legea nr. 383/2003 a apiculturii;
- Protocol de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România;
- Protocol de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România (ROMAPIS).

Coordonator,
Elena STANCU

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR